

مقایسه کیفیت زندگی اختصاصی در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال شهری و روستایی

مریم مؤمنی^۱، عاطفه قنبری^۲

^۱ پژوهشگر، دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

^۲ استادیار، دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

چکیده

زمینه و هدف:

سرطان کولورکتال یکی از شایع ترین سرطان های تهاجمی و مسئول ایجاد ناراحتی های جسمی و روانی اجتماعی می باشد؛ بنابراین کیفیت زندگی در این بیماران پیامدی مهم است. برخلاف پیشرفت هایی در درک مفهوم کیفیت زندگی، اکثر مطالعات تحقیقی موجود مربوط به مراکز شهری می باشند. از این رو هدف از مطالعه حاضر مقایسه کیفیت زندگی اختصاصی در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال شهری و روستایی می باشد.

روش بررسی:

در این مطالعه مقطعی، ۱۱۰ بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال (۷۹ شهری و ۳۱ روستایی) مراجعه کننده به بیمارستان رازی از طریق مصاحبه و مرور پرونده پزشکی آنان بررسی شدند. کیفیت زندگی اختصاصی با استفاده از پرسشنامه ارزیابی عملکردی درمان سرطان کولورکتال (FACT-C)^۱ ارزیابی شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۶ و آزمون های آماری تی مستقل و کای دو تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها:

میانگین مجموع امتیازات کیفیت زندگی بیماران شهری نسبت به روستاییان بالاتر بود ($p < 0/05$) که این اختلاف در ابعاد رفاه جسمی ($p < 0/02$) و رفاه عملکردی ($p < 0/01$) از نظر آماری معنی دار بود. میانگین امتیازات فقط در بعد رفاه اجتماعی/خانوادگی به طور جزئی در روستاییان نسبت به بیماران شهری بالا تر بود اما این اختلاف معنی دار نبود ($p < 0/59$).

نتیجه گیری:

کیفیت زندگی اختصاصی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال برحسب محل سکونت متفاوت می باشد. بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال ساکن در شهر نسبت به روستاییان کیفیت زندگی اختصاصی بالاتری را گزارش کردند؛ که این مسئله به انجام مداخلاتی به منظور ارتقای سطح سلامت و کیفیت زندگی بیماران در نواحی روستایی تأکید می نماید.

کلید واژه: سرطان کولورکتال، کیفیت زندگی اختصاصی، شهر، روستا

گوارش/ دوره ۱۵، شماره ۴/ زمستان ۱۳۸۹/ ۲۶۳-۲۷۰

1. Functional Assessment of Cancer Therapy-Colorectal

نویسنده مسئول:

دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت، دانشگاه علوم پزشکی

گیلان، رشت، ایران

تلفن: ۰۱۳۱-۵۵۵۵۰۵۶

نمابر: ۰۱۳۱-۵۵۵۰۰۹۷

پست الکترونیک: atghanbari87@gmail.com

تاریخ دریافت: ۹۰/۲/۱

تاریخ اصلاح نهایی: ۹۰/۳/۳۰

تاریخ پذیرش: ۹۰/۴/۱

زمینه و هدف:

سرطان کولورکتال مهم ترین علت موربیدیتی و مورتالیتی ناشی از سرطان می باشد. (۱)، سرطان کولورکتال یک مشکل عمده در سراسر جهان بوده که بروز سالانه آن تقریباً یک میلیون مورد می باشد و سالانه مورتالیتی بیش از ۵۰۰۰۰۰ مورد دارد. (۲)، سرطان کولورکتال چهارمین سرطان شایع در ایران است. (۳)، بر طبق گزارش ثبت ملی سالیانه سرطان در ایران، سرطان کولورکتال در زنان سومین و در مردان پنجمین سرطان شایع می باشد که بروز آن در ایران در طی